

ID 氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

WeeklyPTX 単独療法	
3投1休(4週毎)	
疾患名	頭頸部癌
T	N M Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m<sup>2</sup>

スケジュール HBs抗原 ( + - ) HBc抗体 ( + - ) HCV抗体 ( + - )

《注射》 パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	Day1 ↓	Day8 ↓	Day15 ↓	Day22	Day28
-----------------	----------------------	-----------	-----------	------------	-------	-------

パクリタキセル

- ・0.22 μm以下のインラインフィルターを使用すること。
- ・アルコール過敏症に注意する。
- ・投与開始1時間は過敏反応の有無を頻回を確認する。
- ・心電図モニターを装着する。
- ・壊死性抗がん薬のため血管外漏出に注意すること。

### Day1.8.15

				投与ルート
①	レスタミン10mg 5錠	内服	抗がん剤投与30分前	
②	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
③	デキサート1.65mg 4A 生食20ml	DIV		側管
④	ファモチジン静注20mg 1A	DIV		側管
30分後				
⑤	パクリタキセル( )mg 生食250ml	DIV	60分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				