

ID	
氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

CDDP+CPT-11療法	
4週毎	
疾患名 膵神経内分泌腫瘍(保険未承認)	
T	N M Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m²

スケジュール HBs抗原 (+ -) HBe抗体 (+ -) HCV抗体 (+ -)

《注射》		Day1				
シスプラチン 60mg/m ²		↓				
		Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
イリノテカン 60mg/m ²		↓	↓	↓		

シスプラチン

- ・1日尿量が3000ml以上になるように輸液を行う。
- ・遮光にて投与
- ・腎機能不良の場合は禁忌
- ・Day1~4は尿測と体重測定、Day5~7は体重測定のみを行う。合併症によってその都度対応すること。
- ・適宜利尿薬を併用する。

イリノテカン

- ・投与前に腹痛、下痢の有無を確認する。早発性(投与中~投与直後)、遅発性(投与24hr以降)の下痢が頻発する。
- ・必要時、投与前日から半夏瀉心湯を開始する。

Day1

抗がん薬投与1時間前にアプレピタントカプセル125mg1Cを内服				
①	生食500ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
②	ソルデム3A 500ml	DIV	120分	側管
③	パロノセトロン0.75mg/50ml 1V デキサート1.65mg 6A	IV	30分	側管
④	イリノテカン()mg 5%ブドウ糖液250ml	DIV	90分	側管
⑤	ソルデム3A 500ml	DIV	120分	側管
⑥	シスプラチン()mg 生食350ml (生食150mlを抜く)	DIV	120分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				
⑦	20%マンニトール300ml ※湯煎溶解必要	DIV	30分	側管
⑧	ソルデム3A 500ml	DIV	120分	側管
⑨	ソルデム3A 500ml	DIV	120分	側管
⑩	ソルデム3A 500ml (※尿量をみて必要により追加)	DIV		側管

Day8.15

抗がん薬投与1時間前にアプレピタントカプセル125mg1Cを内服				
①	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
②	パロノセトロン0.75mg/50ml 1V デキサート1.65mg 3A	DIV	30分	側管
④	イリノテカン()mg 5%ブドウ糖液250ml	DIV	90分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				

Day2.3

★処方確認 17時までに病棟に薬があがっているか確認 申し送りへ記載
アプレピタントカプセル80mg 1c 1×朝

Day2.3.4

★処方確認 17時までに病棟に薬があがっているか確認 申し送りへ記載
デカドロン錠0.5mg 16T 2×朝・昼