ID
氏名

生年月日

年齢　　性別
科名　　病棟

XELOX療法
3週毎

疾患名　　胃癌

T　N　M　Stage

主治医　　指導医

(身長　　cm・体重　　kg) 体表面積　　㎡

スケジュール　　HBs抗原（ ＋ － ）　HBc抗体（ ＋ － ）　HCV抗体（ ＋ － ）

《注射》　　Day1　　Day21
オキサリプラチン　130mg/㎡　↓

《内服》　　Day1(夕)　　Day15(朝)　《7日間休薬》
カペシタビン　↓……↓　←→

カペシタビン

・手足症候群に注意する。

オキサリプラチン

・末梢神経障害緩和のためホットパックを使用する。
・治療期間中は冷感刺激を避ける。(金属類との接触、冷たい食事や飲み物、エアコンの風など)

(レジメン)Day1

抗がん薬投与１時間前にアプレピタントカプセル(125mg)1Cを内服				投与ルート
①	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
②	アロキシ(0.75㎎/5ml)　1V 生食15ml	IV		側管
③	デキサート(1.65mg)　4A 生食20ml	IV		側管
④	オキサリプラチン（　　）mg デキサート(1.65mg)　4A 5%ブドウ糖液250ml	DIV	120分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				

Day2.3
アプレピタントカプセル(80mg)　1c　1×朝
デカドロン錠(0.5mg)　8T　2×朝･昼

Day1(夕)～15(朝)
カペシタビン（　　）mg/day　2×朝･夕

体表面積	1日用量
1.36㎡未満	2400mg/day
1.36㎡～1.66㎡	3000mg/day
1.66㎡～1.96㎡	3600mg/day
1.96㎡以上	4200mg/day