ID
氏名

生年月日

年齢　　性別
科名　　病棟

Capecitabine+BV療法 3週毎

疾患名　　大腸癌

T　N　M　Stage

主治医　　指導医

(身長　　cm・体重　　kg) 体表面積　　㎡

HBs抗原（　＋　－ HBc抗体（　＋　－ HCV抗体（　＋　－

スケジュール

《注射》 ベバシズマブ	7.5mg/kg	Day1 ↓		Day21
《内服》 カペシタビン		Day1(夕) ↓……	Day15(朝) ↓	《7日間休薬》 ←→

カペシタビン

・手足症候群に注意する。

ベバシズマブ

・投与前に血圧を測定する。収縮期≧160 or 拡張期≧100を超える場合は主治医に確認する。
・出血傾向、血栓有無を確認する。

Day1

				投与ルート
①	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
②	ベバシズマブ　（　　）mg 生食100ml	DIV	初回９０分 ２回目６０分 以後３０分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				

Day1(夕)～15(朝)

★処方確認　17時までに病棟に薬があがっているか確認　申し送りへ記

				投与ルート
①	カペシタビン（　　）mg/day　２×朝･夕	内服		

体表面積	1日用量
1.36㎡未満	2400mg/day
1.36㎡～1.66㎡	3000mg/day
1.66㎡～1.96㎡	3600mg/day
1.96㎡以上	4200mg/day