

ID 氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

IRIS療法	
3週毎	
疾患名	大腸癌
T	N
M	Stage

主治医 _____

指導医 _____

(身長 _____ cm・体重 _____ kg) 体表面積 _____ m²

スケジュール HBs抗原 (+ -) HBe抗体 (+ -) HCV抗体 (+ -)

《注射》 イリノテカン塩酸塩	150mg/m ²	Day1 ↓	Day21
《内服》 エスワンタイホウ (テガフル・ギメラシル・オテラシル)	↓	Day1(夕)	Day15(朝) 《7日間休薬》 ↔

イリノテカン

- ・投与前に腹痛、下痢の有無を確認する。早発性(投与中～投与直後)、遅発性(投与24hr以降)の下痢が頻発する。
- ・必要時、投与前日から半夏瀉心湯を開始する。

Day1

				投与ルート
①	アプレピタントカプセル125mg 1C	内服	イリノテカン投与 1時間前	
②	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
③	パロノセトロン0.75mg/50ml 1V デキサート1.65mg 3A	DIV	30分	側管
④	イリノテカン()mg 5%ブドウ糖液250ml	DIV	90分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				

Day1(夕)～15(朝) ★処方確認 17時まで病棟に薬があがっているか確認 申し送りへ記

				投与ルート
①	エスワンタイホウ () mg/day	2×朝	内服	

Day2.3 ★処方確認 17時まで病棟に薬があがっているか確認 申し送りへ記載

				投与ルート
①	アプレピタントカプセル80mg	1c 1×朝	内服	
②	デカドロン錠0.5mg	8T 2×朝・昼	内服	

体表面積	1日用量(テガフル相当量)
1.25m ² 未満	80mg/day
1.25m ² ～1.5m ²	100mg/day
1.5m ² 以上	120mg/day