

ID 氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

IRIS+BV療法			
3週毎			
疾患名	大腸癌		
T	N	M	Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m<sup>2</sup>

スケジュール HBs抗原 ( + - ) HBe抗体 ( + - ) HCV抗体 ( + - )

《注射》		Day1	Day21
ベバシズマブ	7.5mg/kg	↓	
イリノテカン塩酸塩	150mg/m <sup>2</sup>	↓	
《内服》		Day1(夕)	Day15(朝) 《7日間休薬》
エスワンタイホウ (テガフル・ギメラシル・オテラシル)		↓…………… ↓	↔

イリノテカン

- ・投与前に腹痛、下痢の有無を確認する。早発性(投与中～投与直後)、遅発性(投与24hr以降)の下痢が頻発する。
- ・必要時、投与前日から半夏瀉心湯を開始する。

ベバシズマブ

- ・投与前に血圧を測定する。収縮期 $\geq 160$  or 拡張期 $\geq 100$ を超える場合は主治医に確認する。
- ・出血傾向、血栓有無を確認する。

Day1

				投与ルート
①	アプレピタントカプセル125mg 1C	内服	イリノテカン投与 1時間前	
②	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
③	パロノセトロン0.75mg/50ml 1V デキサート1.65mg 3A	DIV	30分	側管
④	ベバシズマブ ( )mg 生食100ml	DIV	初回90分 2回目60分 以降30分	側管
⑤	イリノテカン( )mg 5%ブドウ糖液250ml	DIV	90分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				

Day1(夕)～15(朝) ★処方確認 17時までに病棟に薬があがっているか確認 申し送りへ記載

				投与ルート
①	エスワンタイホウ ( ) mg/day	2×朝	内服	

Day2.3 ★処方確認 17時までに病棟に薬があがっているか確認 申し送りへ記載

				投与ルート
①	アプレピタントカプセル80mg 1c	1×朝	内服	
②	デカドロン錠0.5mg 8T	2×朝・昼	内服	

体表面積	1日用量(テガフル相当量)
1.25m <sup>2</sup> 未満	80mg/day
1.25m <sup>2</sup> ～1.5m <sup>2</sup>	100mg/day