

ID
氏名

生年月日

年齢 性別
科名 病棟

S-1+BV療法
3週毎
疾患名 大腸癌

T N M Stage

主治医

(身長 cm • 体重 kg) 体表面積 m²

指導医

スケジュール HBs抗原 (+ -) HBe抗体 (+ -) HCV抗体 (+ -)

《注射》 ペバシズマブ 7.5mg/kg	Day1 ↓	Day21
《内服》 エスワнтаイホウ (テガフル・ギメラシル・オテラシル)	Day1(夕) ↓	Day15(朝) ↓ 《7日間休薬》 ↔

ペバシズマブ

- 投与前に血圧を測定する。収縮期 ≥ 160 or 拡張期 ≥ 100 を超える場合は主治医に確認する。
- 出血傾向、血栓有無を確認する。

Day1

				投与ルート
①	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
②	ペバシズマブ ()mg 生食100ml	DIV	初回90分 2回目60分 以後30分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				

Day1(夕)~15(朝) ★処方確認 17時までに病棟に薬があがっているか確認 申し送りへ

				投与ルート
①	エスワнтаイホウ () mg/day	2×朝	内服	

体表面積	1日用量(テガフル相当量)
1.25m ² 未満	80mg/day
1.25m ² ~1.5m ²	100mg/day
1.5m ² 以上	120mg/day