

ID	
氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

SOX療法			
3週毎			
疾患名	大腸癌		
T	N	M	Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m<sup>2</sup>

スケジュール HBs抗原 ( + - ) HBe抗体 ( + - ) HCV抗体 ( + - )

《注射》 オキサリプラチン 130mg/m <sup>2</sup>	Day1 ↓	Day21
《内服》 エスワンタイホウ (テガフル・ギメラシル・オテラシル) ↓	Day1(夕)	Day15(朝)
	↓	《7日間休薬》 ←→

オキサリプラチン

- ・末梢神経障害緩和のためホットパックを使用する。
- ・治療期間中は冷感刺激を避ける。(金属類との接触、冷たい食事や飲み物、エアコンの風など)

Day1

				投与ルート
①	アプレピタントカプセル125mg 1C	内服	オキサリプラチン投与 1時間前	
②	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
④	パロノセトロン0.75mg/50ml 1V デキサート1.65mg 3A	DIV	30分	側管
⑤	オキサリプラチン( )mg デキサート1.65mg 4A 5%ブドウ糖液250ml	DIV	120分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				

Day1(夕)~15(朝) ★処方確認 17時までに病棟に薬があがっているか確認 申し送りへ記載

				投与ルート
①	エスワンタイホウ ( ) mg/day	2×朝	内服	

Day2.3 ★処方確認 17時までに病棟に薬があがっているか確認 申し送りへ記載

				投与ルート
①	アプレピタントカプセル80mg 1c	1×朝	内服	
②	デカドロン錠0.5mg 8T	2×朝・昼	内服	

体表面積	1日用量(テガフル相当量)
1.25m <sup>2</sup> 未満	80mg/Day
1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup>	100mg/Day
1.5m <sup>2</sup> 以上	120mg/Day