

ID	
氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

TAS-102+BV療法			
5投9休			
2週毎			
疾患名	大腸癌		
T	N	M	Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m<sup>2</sup>

HBs抗原 ( + - ) HBe抗体 ( + - ) HCV抗体 ( + - )  
スケジュール

《注射》 ペバシズマブ	5mg/kg	Day1 ↓	Day14
《内服》 ロンサーフ (TAS-102)	35mg/m <sup>2</sup>	Day1(夕) ↓ 5日間	Day6(朝) ← 《9日間休薬》 →

ペバシズマブ

- ・投与前に血圧を測定する。収縮期 $\geq 160$  or 拡張期 $\geq 100$ を超える場合は主治医に確認する。
- ・出血傾向、血栓有無を確認する。

Day1

①	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)	投与ルート
②	ペバシズマブ ( )mg	DIV	初回90分 2回目60分 以後30分	メイン 側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				

Day1(夕)~6(朝) ★処方確認 17時までに病棟に薬があがっているか確認 申し送りへ記載

①	ロンサーフ ( ) mg/day	2×朝・夕食後	内服	投与ルート

体表面積	1日用量
1.07m <sup>2</sup> 未満	70mg/day
1.07m <sup>2</sup> ~1.23m <sup>2</sup>	80mg/day
1.23m <sup>2</sup> ~1.38m <sup>2</sup>	90mg/day
1.38m <sup>2</sup> ~1.53m <sup>2</sup>	100mg/day
1.53m <sup>2</sup> ~1.69m <sup>2</sup>	110mg/day
1.69m <sup>2</sup> ~1.84m <sup>2</sup>	120mg/day
1.84m <sup>2</sup> ~1.99m <sup>2</sup>	130mg/day
1.99m <sup>2</sup> ~2.15m <sup>2</sup>	140mg/day
2.15m <sup>2</sup> 以上	150mg/day