

ID 氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

<b>XELIRI療法</b>	
<b>3週毎</b>	
疾患名 進行再発結腸・直腸癌	
T	N M Stage

主治医 \_\_\_\_\_

指導医 \_\_\_\_\_

(身長 \_\_\_\_\_ cm・体重 \_\_\_\_\_ kg) 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

スケジュール HBs抗原 ( + - ) HBe抗体 ( + - ) HCV抗体 ( + - )

《注射》 イリノテカン	200mg/m <sup>2</sup>	Day1 ↓	Day21
《内服》 カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	Day1(夕) ↓	Day15(朝) 《7日間休薬》 ↓ ←→

**イリノテカン**

- ・投与前に腹痛、下痢の有無を確認する。早発性(投与中～投与直後)、遅発性(投与24hr以降)の下痢が頻発する。
- ・必要時、投与前日から半夏瀉心湯を開始する。

**カペシタビン**

- ・手足症候群に注意する。

**Day1**

				投与ルート
①	アプレピタントカプセル125mg 1C	内服	イリノテカン投与 1時間前	
②	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
③	パロノセトロン0.75mg/50ml 1V デキサート1.65mg 3A	DIV	30分	側管
④	イリノテカン ( ) mg 5%ブドウ糖液250ml	DIV	90分	
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				

**Day1(夕)～15(朝) ★処方確認 17時までに病棟に薬があがっているか確認 申し送りへ**

				投与ルート
①	カペシタビン ( ) mg/day	2×朝・夕	内服	