

ID 氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

XELOX療法			
3週毎			
疾患名	大腸癌		
T	N	M	Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m²

スケジュール HBs抗原 (+ -) HBe抗体 (+ -) HCV抗体 (+ -)

《注射》 オキサリプラチン	130mg/m ²	Day1 ↓	Day21
《内服》 カペシタビン		Day1(夕) ↓	Day15(朝) 《7日間休薬》 ↓ ←→

カペシタビン

- ・手足症候群に注意する。

オキサリプラチン

- ・末梢神経障害緩和のためホットパックを使用する。
- ・治療期間中は冷感刺激を避ける。(金属類との接触、冷たい食事や飲み物、エアコンの風など)

Day1

				投与ルート
①	アプレピタントカプセル125mg 1C	内服	オキサリプラチン投与 1時間前	
②	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
③	パロノセトロン0.75mg/50ml 1V デキサート1.65mg 4A	DIV	30分	側管
④	オキサリプラチン() mg デキサート1.65mg 4A 5%ブドウ糖液250ml	DIV	120分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				

Day1(夕)~15(朝) ★処方確認 17時までに病棟に薬があがっているか確認 申し送りへ記

				投与ルート
①	カペシタビン() mg/day	2×朝・夕	内服	

Day2.3 ★処方確認 17時までに病棟に薬があがっているか確認 申し送りへ記載

				投与ルート
①	アプレピタントカプセル80mg 1c	1×朝	内服	
②	デカドロン錠0.5mg	8T 2×朝・昼	内服	

進行・再発の結腸・直腸癌/胃癌	
体表面積	1日用量
1.36m ² 未満	2400mg/day
1.36m ² ~1.66m ²	3000mg/day
1.66m ² ~1.96m ²	3600mg/day
1.96m ² 以上	4200mg/day

結腸・直腸癌における補助化学療法	
体表面積	1日用量
1.33m ² 未満	3000mg/day
1.33m ² ~1.57m ²	3600mg/day
1.57m ² ~1.81m ²	4200mg/day
1.81m ² 以上	4800mg/day