

ID	
氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

XELOX+BV療法
3週毎
疾患名 進行再発結腸・直腸癌

T N M Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m²

スケジュール HBs抗原 (+ -) HBe抗体 (+ -) HCV抗体 (+ -)

《注射》 ペバシズマブ オキサリプラチン	7.5mg/kg 130mg/m ²	Day1 ↓ ↓	Day21
《内服》 カペシタピン		Day1(夕) ↓……………↓	Day15(朝) 《7日間休薬》 ↔

カペシタピン

- ・手足症候群に注意する。

オキサリプラチン

- ・末梢神経障害緩和のためホットパックを使用する。
- ・治療期間中は冷感刺激を避ける。(金属類との接触、冷たい食事や飲み物、エアコンの風など)

ペバシズマブ

- ・投与前に血圧を測定する。収縮期 ≥ 160 or 拡張期 ≥ 100 を超える場合は主治医に確認する。
- ・出血傾向、血栓有無を確認する。

Day1

				投与ルート
①	アプレピタントカプセル125mg 1C	内服	オキサリプラチン投与 1時間前	
②	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
③	パロノセトロン0.75mg/50ml 1V デキサート1.65mg 4A	DIV	30分	側管
④	ペバシズマブ ()mg 生食100ml	DIV	初回90分 2回目60分 以降30分	側管
⑤	オキサリプラチン ()mg デキサート1.65mg 4A 5%ブドウ糖液250ml	DIV	120分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				

Day1(夕)~15(朝)

★処方確認 17時までに病棟に薬があがっているか確認 申し送りへ

				投与ルート
①	カペシタピン () mg/day	2×朝・夕	内服	

Day2.3

★処方確認 17時までに病棟に薬があがっているか確認 申し送りへ記載

				投与ルート
①	アプレピタントカプセル80mg 1c	1×朝	内服	
②	デカドロン錠0.5mg	8T 2×朝・昼	内服	

体表面積	1日用量
1.36m ² 未満	2400mg/day
1.36m ² ~1.66m ²	3000mg/day
1.66m ² ~1.96m ²	3600mg/day
1.96m ² 以上	4200mg/day