

ID 氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟


FP療法	
4週毎	
疾患名	頭頸部癌
T	N M Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m²

スケジュール HBs抗原 (+ -) HBe抗体 (+ -) HCV抗体 (+ -)



シスプラチン

- ・1日尿量が3000ml以上になるように輸液を行う。
- ・遮光にて投与
- ・腎機能不良の場合は禁忌
- ・Day1～4は尿測と体重測定、Day5～7は体重測定のみを行う。合併症によってその都度対応すること。
- ・適宜利尿薬を併用する。

Day1

				投与ルート
①	アプレピタントカプセル125mg1C	内服	シスプラチン投与 1時間前に服用	
②	生食500ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
③	生食500ml	DIV	180分	側管
④	生食500ml	DIV	180分	側管
⑤	パロブセトロン0.75mg/50ml 1V デキサート1.65mg 6A	DIV	30分	側管
⑥	シスプラチン()mg 生食300ml	DIV	120分	側管
⑦	20%マンニトール300ml ※湯煎溶解必要	DIV	30分	側管
⑧	フルオロウラシル持続 ()mg 生食1150ml	DIV	約120時間	側管
⑨	生食500ml	DIV	180分	側管
尿量みて必要時補液の追加指示を受ける				

持続注射
Day1-⑧



Day2 - 5

①	生食500ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
②	デキサート1.65mg 4A 生食20ml	IV		側管

Day2.3

★処方確認 17時までに病棟に薬があがってきているか確認 申し送りへ記載

①	アプレピタントカプセル80mg 1c 1×朝	内服	
---	------------------------	----	--