ID
氏名

生年月日

年齢　　性別
科名　　病棟

FP+Pembrolizumab療法
3週毎(6コースまで)

疾患名　　頭頸部癌

T　N　M　Stage

主治医　　指導医

(身長　　cm・体重　　kg) 体表面積　　㎡

スケジュール　　HBs抗原（ ＋ － ）　HBc抗体（ ＋ － ）　HCV抗体（ ＋ － ）

《注射》		Day1	Day4	Day21
キイトルーダ(ペンブロリズマブ)	200mg/body	↓		
シスプラチン	80mg/㎡	↓		
フルオロウラシル	3200mg/㎡/4日 【800mg/㎡/日】	↓	⟶	

シスプラチン

・1日尿量が3000ml以上になるように輸液を行う。
・遮光にて投与
・腎機能不良の場合は禁忌
・Day1～4は尿測と体重測定、Day5～7は体重測定のみを行う。合併症によってその都度対応すること。
・適宜利尿薬を併用する。

キイトルーダ

・0.22μm以下のインラインフィルターを使用すること。
・7コース以降はキイトルーダ単剤とすること。

Day1

				投与ルート	
①	アプレピタントカプセル125mg1C	内服	シスプラチン 投与1時間前	メイン	
②	生食500ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン	
③	ソルラクト 500ml	DIV	120分	側管	
④	ボララミン注 1A	IV		側管	
⑤	キイトルーダ100mg 2v 生食100ml	DIV	30分	側管	
⑥	ソルデム3A 500ml 硫酸マグネシウム注 0.4A	DIV	120分	側管	
⑦	パロノセトロン0.75㎎/50ml 1V デキサート1.65mg 6A	DIV	30分	側管	
⑧	シスプラチン(　　)mg 生食300ml	DIV	120分	側管	
⑨	20%マンニトール300ml ※湯煎溶解必要	DIV	30分	側管	
⑩	フルオロウラシル持続（　　)mg 生食 フルオロウラシルと合わせて全量500ml	DIV	96時間	側管	持続注射 Day1-4
⑪	ソルラクト 500ml	DIV	120分	側管	
⑫	ソルラクト 500ml	DIV	120分	側管	
⑬	ソルデム3A 500ml	DIV	120分	側管	
⑭	ソルデム3A 500ml	DIV	120分	側管	
	尿量みて必要時補液の追加指示受ける				

Day2-4

①	生食500ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
②	デキサート1.65mg 6A 生食20ml	IV		側管

Day2.3　★処方確認　17時までに病棟に薬があがってきているか確認　申し送りへ記載

①	アプレピタントカプセル80mg　1c　1×朝	内服	