

ID	
氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

PTX+Cetuximab療法
2回目以降
1週毎

疾患名 頭頸部癌

T N M Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 m²)

スケジュール HBs抗原 (+ -) HBe抗体 (+ -) HCV抗体 (+ -)

《注射》		Day1	Day7
アービタックス(セツキシマブ)	250mg/m ²	↓	
パクリタキセル	60mg/m ²	↓	

パクリタキセル

- ・0.22 μm以下のインラインフィルターを使用すること。
- ・アルコール過敏症に注意する。
- ・投与開始1時間は過敏反応の有無を頻回に確認する。
- ・心電図モニターを装着する。
- ・壊死性抗がん薬のため血管外漏出に注意すること。

アービタックス

- ・皮膚障害が高頻度に出現する。
- ・低マグネシウム血症に注意。

Day1

				投与ルート
①	レスタミン10mg 5錠	内服	抗がん剤投与30分前	
②	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
③	デキサート1.65mg 4A 生食20ml	IV		側管
④	ファモチジン注射液20mg 1A	IV		側管
30分後				
⑤	アービタックス()mg 生食250ml	DIV	120分	側管
⑥	パクリタキセル()mg 5%ブドウ糖液250ml	DIV	60分	側管