

ID 氏名	
生年月日	
年齢 科名	性別 病棟

GC療法	
4週毎	
疾患名	尿路上皮癌
T	N M Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m²

スケジュール HBs抗原 (+ -) HBc抗体 (+ -) HCV抗体 (+ -)

《注射》		Day	Day2	Day8	Day15	Day22	Day28
シスプラチン	70mg/m ²		↓				
ゲムシタピン	1000mg/m ²		↓	↓	↓		

ゲムシタピン

- ・投与時間を60分以上かけると副作用が増強することがあるため、30分間で終了させること。

シスプラチン

- ・1日尿量が3000ml以上になるように輸液を行う。
- ・遮光にて投与
- ・腎機能不良の場合は禁忌
- ・Day1～4は尿測と体重測定、Day5～7は体重測定のみを行う。合併症によってその都度対応すること。
- ・適宜利尿薬を併用する。

Day1.8.15

				投与ルート
①	生食100ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
②	デキサート1.65mg 4A 生食20ml	IV		側管
③	ゲムシタピン () mg 生食100ml	DIV	30分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				

Day2

				投与ルート
①	アブレヒタントカプセル125mg1C	内服	抗がん剤投与1時間前	
②	生食500ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
③	ソルデム3A 500ml	DIV	120分	側管
④	ソルデム3A 500ml	DIV	120分	側管
⑤	パロノセトロン0.75mg/50ml 1V デキサート1.65mg 6A	IV	30分	側管
⑥	シスプラチン() mg 生食350ml (生食150mlを抜く)	DIV	120分	側管
⑦	20%マンニトール 300ml ※湯煎溶解必要	DIV	30分	側管
⑧	ソルデム3A 500ml	DIV	120分	側管
⑨	ソルデム3A 500ml	DIV	120分	側管

Day3・4 尿量をみて必要により追加

①	ソルデム3A 500ml	DIV	120分	
②	ソルデム3A 500ml	DIV	120分	

Day3.4

				投与ルート
①	アブレヒタントカプセル80mg1C 1×朝	内服		

Day3.4.5

				投与ルート
①	デカドロン錠0.5mg 16T 2×朝・昼	内服		