

ID	
氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

GC+Durvalumab療法			
3週毎			
疾患名	胆道癌		
T	N	M	Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m<sup>2</sup>

スケジュール HBs抗原 ( + - ) HBc抗体 ( + - ) HCV抗体 ( + - )

《注射》		Day1	Day8	Day15	Day21
シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	↓	↓		
ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	↓	↓		
イミフィンジ	1500mg/body	↓			

ゲムシタピン

- ・投与時間を60分以上かけると副作用が増強することがあるため、30分間で終了させること。

シスプラチン

- ・1日尿量が3000ml以上になるように輸液を行う。
- ・遮光にて投与
- ・腎機能不良の場合は禁忌
- ・Day1～4は尿測と体重測定、Day5～7は体重測定のみを行う。合併症によってその都度対応すること。
- ・適宜利尿薬を併用する。

イミフィンジ

- ・体重30kg以下の場合は、20mg/kgとする。
- ・0.22 μm以下のインラインフィルターを使用すること。

Day1

				投与ルート
①	アプレピタントカプセル125mg1C	内服	シスプラチン投与 1時間前	
②	レスタミン10mg5錠	内服	イミフィンジ投与 30分前	
③	生食500ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
④	イミフィンジ500mg 3v 生食100ml	DIV	60分	側管
⑤	ソルデム3A 500ml	DIV	120分	側管
⑥	パロノセトロン0.75mg/50ml 1V デキサート1.65mg 6A	DIV	30分	側管
⑦	シスプラチン ( ) mg 生食250ml	DIV	120分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				
⑧	ソルデム3A 500ml	DIV	120分	側管
⑨	ゲムシタピン ( ) mg 生食100ml	DIV	30分	側管
⑩	ソルデム3A 500ml	DIV	120分	側管

⑪	ソルテム3A 500ml	DIV	120分	側管
尿量みて必要時補液の追加指示を受ける				

## Day8

				投与ルート
①	アブレピタントカプセル125mg1C	内服	抗がん剤投与1時間前	
②	生食500ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
③	ソルテム3A 500ml	DIV	120分	側管
④	パロフセトロン0.75mg/50ml 1V デキサート1.65mg 6A	DIV	30分	側管
⑤	シスプラチン( ) mg 生食250ml	DIV	120分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				
⑥	ソルテム3A 500ml	DIV	120分	側管
⑦	ゲムシタピン( ) mg 生食100ml	DIV	30分	側管
⑧	ソルテム3A 500ml	DIV	120分	側管
⑨	ソルテム3A 500ml	DIV	120分	側管
尿量みて必要時補液の追加指示を受ける				

## Day2・3 9・10

				投与ルート
①	アブレピタントカプセル80mg1C	1×朝	内服	
②	デカドロン錠0.5mg	16T 2×朝・昼	内服	