ID
氏名

生年月日

年齢　　性別
科名　　病棟

GEM+nab-PTX療法
1投1休(2週毎)

疾患名　　膵癌

T　N　M　Stage

主治医　　指導医

(身長　　cm・体重　　kg) 体表面積　　㎡

スケジュール　　HBs抗原（ ＋ － ）　HBc抗体（ ＋ － ）　HCV抗体（ ＋ － ）

《注射》		Day1	Day8	Day14
ゲムシタビン	1000mg/㎡	↓		
アブラキサン	125mg/㎡	↓		

ゲムシタビン

・投与時間を60分以上かけると副作用が増強することがあるため、30分間で終了させること。

アブラキサン

・血液製剤同意書が必要。
・投与開始1時間は過敏反応の有無を頻回に確認する。
・心電図モニターを装着する。

Day1

				投与ルート
①	レスタミン10mg５錠	内服	抗がん剤投与30分前	
②	生食100ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
③	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50ml	DIV	15分	側管
④	デキサート1.65mg 4A 生食20ml	IV		側管
⑤	アブラキサン(　　)mg	DIV	30分	側管
⑥	ルート内フラッシュ			
⑦	ゲムシタビン(　　)mg 生食100ml	DIV	30分	側管