

ID 氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

<b>GEM+nab-PTX療法</b>			
<b>2投1休(3週毎)</b>			
疾患名	膵癌		
T	N	M	Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m<sup>2</sup>

スケジュール HBs抗原 ( + - ) HBc抗体 ( + - ) HCV抗体 ( + - )

《注射》		Day1	Day8	Day15	Day21
ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	↓	↓		
アブラキサン	125mg/m <sup>2</sup>	↓	↓		

ゲムシタピン

- ・投与時間を60分以上かけると副作用が増強することがあるため、30分間で終了させること。

アブラキサン

- ・血液製剤同意書が必要。
- ・投与開始1時間は過敏反応の有無を頻回に確認する。
- ・心電図モニターを装着する。

Day1.8

				投与ルート
①	レスタミン10mg5錠	内服	抗がん剤投与30分前	
②	生食100ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
③	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50ml	DIV	15分	側管
④	デキサート1.65mg 4A 生食20ml	IV		側管
⑤	アブラキサン( )mg	DIV	30分	側管
⑥	ルート内フラッシュ			
⑦	ゲムシタピン( )mg 生食100ml	DIV	30分	側管