

ID 氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

GS療法	
2投1休 (3週毎)	
疾患名	胆道癌
T	N M Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m²

スケジュール HBs抗原 (+ -) HBc抗体 (+ -) HCV抗体 (+ -)

《注射》 ゲムシタピン	1000mg/m ²	Day1 ↓	Day8 ↓	Day15	Day21
《内服》 エスワンタイホウ (テガフル・ギメラシル・オテラシル ↓ …………… ↓		Day1(夕)		Day15(朝)	《7日間休薬》 ↔

ゲムシタピン

- ・投与時間を60分以上かけると副作用が増強することがあるため、30分間で終了させること。

エスワンタイホウ

- ・ゲムシタピンとの併用時は用量を1段階減量すること。

Day1.8

①	生食100ml	DIV	血管確保(20ml/h)	投与ルート メイン
②	デキサート1.65mg 4A 生食20ml	IV		側管
③	ゲムシタピン()mg 生食100ml	DIV	30分	側管
終了後メインの生食でフラッシュ				

Day1(夕)~15(朝)

①	エスワンタイホウ () mg/day	2×朝・夕	内服	投与ルート
---	---------------------	-------	----	-------

体表面積	1日用量(テガフル相当量)
1.25m ² 未満	80mg/day
1.25m ² ~1.5m ²	100mg/day