

ID 氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

GS療法	
2投1休 (3週毎)	
疾患名	膵癌
T	N M Stage

主治医 _____

指導医 _____

(身長 _____ cm・体重 _____ kg) 体表面積 _____ m²

スケジュール HBs抗原 (+ -) HBc抗体 (+ -) HCV抗体 (+ -)

《注射》		Day1	Day8	Day15	Day21
ゲムシタピン	1000mg/m ²	↓	↓		
《内服》		Day1(夕)		Day15(朝)	《7日間休薬》
エスワンタイホウ (テガフル・ギメラシル・オテラシル ↓ …………… ↓				↓	↔

ゲムシタピン

- ・投与時間を60分以上かけると副作用が増強することがあるため、30分間で終了させること。

エスワンタイホウ

- ・ゲムシタピンとの併用時は用量を1段階減量すること。

Day1.8

				投与ルート
①	生食100ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
②	デキサート1.65mg 4A 生食20ml	IV		側管
③	ゲムシタピン()mg 生食100ml	DIV	30分	側管
終了後メインの生食でフラッシュ				

Day1(夕)~15(朝)

			投与ルート
①	エスワンタイホウ () mg/day	2×朝・夕	内服

体表面積	1日用量(テガフル相当量)
1.25m ² 未満	80mg/day
1.25m ² ~1.5m ²	100mg/day
1.5m ² 以上	120mg/day