

ID 氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

CDDP+Pemetrexed療法	
3週毎(6コースまで)	
疾患名	非小細胞肺癌
T	N M Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m<sup>2</sup>

スケジュール HBs抗原 ( + - ) HBe抗体 ( + - ) HCV抗体 ( + - )

《注射》		Day1	Day21
アリムタ(ペメトレキセド)	500mg/m <sup>2</sup>	↓	
シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	↓	

シスプラチン

- ・アリムタ投与後30分あけてから投与する。
- ・1日尿量が3000ml以上になるように輸液を行う。
- ・遮光にて投与
- ・腎機能不良の場合は禁忌
- ・Day1~4は尿測と体重測定、Day5~7は体重測定のみを行う。合併症によってその都度対応すること。
- ・適宜利尿薬を併用する。

アリムタ

- ・副作用予防のために葉酸とVB12を投与する
- ・パンピタン末：アリムタ初回投与の7日前から開始(1g/day連日) アリムタ最終投与から3週間連日服用
- ・フレスミンS注：アリムタ初回投与の7日前から開始(1mg/day筋注) アリムタ最終投与から3週間まで9週毎に1回投与

Day1

				投与ルート
①	アプレピタントカプセル125mg1C	内服	シスプラチン投与 1時間前	
②	生食500ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
③	ソルラクト 500ml	DIV	120分	側管
④	ソルデム3A 500ml 硫酸マグネシウム注 0.4A	DIV	120分	側管
⑤	パロノセトロン0.75mg/50ml 1V デキサート1.65mg 6A	DIV	30分	側管
⑥	アリムタ ( ) mg 生食100ml	DIV	10分	側管
⑦	生食100ml	DIV	30分	側管
⑧	シスプラチン ( ) mg 生食300ml (生食200mlを抜く)	DIV	120分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				
⑧	20%マンニトール300ml ※湯煎溶解必要	DIV	30分	側管
⑨	ソルラクト 500ml	DIV	120分	側管
⑩	ソルラクト 500ml	DIV	120分	側管
⑪	ソルデム3A 500ml	DIV	120分	側管
⑫	ソルデム3A 500ml	DIV	120分	側管