

ID	
氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

CDDP+VNR adju療法
3週毎(4コースまで)
 疾患名 **非小細胞肺癌**

T N M Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m²

スケジュール HBs抗原 (+ -) HBc抗体 (+ -) HCV抗体 (+ -)

《注射》		Day1	Day8	Day15	Day21
ロゼウス(ピノレルピン)	25mg/m ²	↓	↓		
シスプラチン	80mg/m ²	↓			

シスプラチン

- ・1日尿量が3000ml以上になるように輸液を行う。
- ・遮光にて投与
- ・腎機能不良の場合は禁忌
- ・Day1~4は尿測と体重測定、Day5~7は体重測定のみを行う。合併症によってその都度対応すること。

ロゼウス

- ・壊死性抗がん剤のため、血管外漏出時には強い痛み、組織障害を生じる。

Day1

				投与ルート
①	アプレピタントカプセル125mg1C	内服	シスプラチン投与 1時間前	
②	生食500ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
③	ソルラクト 500ml	DIV	120分	側管
④	ソルラクト 500ml 硫酸マグネシウム注 0.4A	DIV	120分	側管
⑤	パロノセトロン0.75mg/50ml 1V デキサート1.65mg 6A	DIV	30分	側管
⑥	ロゼウス() mg 生食50ml	DIV	5分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				
⑦	シスプラチン() mg 生食300ml (生食200mlを抜く)	DIV	120分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				
⑧	ソルラクト 500ml	DIV	120分	側管
⑨	20%マンニトール300ml ※湯煎溶解必要	DIV	30分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				
⑩	フロセミド注20mg 1A	IV		側管
⑪	ソルラクト 500ml	DIV	120分	側管

Day2,3

①	アプレピタントカプセル80mg 1c 1×朝	内服		
②	デキサート1.65mg 5A 生食20ml	IV		側管
③	ソルラクト 500ml	DIV	120分	側管
④	ソルラクト 500ml	DIV	120分	側管

Day8

①	生食100ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
②	ロゼウス() mg 生食50ml	DIV	5分	側管
③	生食250ml	DIV	60分	メイン