

ID 氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

Pemetrexed単独療法	
3週毎	
疾患名	非小細胞肺癌
T	N M Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m<sup>2</sup>

スケジュール HBs抗原 ( + - ) HBc抗体 ( + - ) HCV抗体 ( + - )

《注射》 アリムタ(ペメトレキセド)	500mg/m <sup>2</sup>	Day1 ↓	Day8	Day15	Day21
-----------------------	----------------------	-----------	------	-------	-------

アリムタ

- ・副作用予防のために葉酸とVB12を投与する
- ・パンピタン末：アリムタ初回投与の7日前から開始(1g/day連日) アリムタ最終投与から3週間連日服用
- ・フレスミンS注：アリムタ初回投与の7日前から開始(1mg/day筋注) アリムタ最終投与から3週間まで9週毎に1回投与

Day1

				投与ルート
①	生食100ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
②	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50ml	IV	15分	側管
③	デキサート1.65mg 4A 生食20ml	IV		側管
④	アリムタ ( )mg 生食100ml	DIV	10分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				