

ID
氏名

生年月日

年齢 性別
科名 病棟

FP療法
4週毎
疾患名 結腸直腸癌(肛門癌)
T N M Stage

主治医
(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m²

指導医

スケジュール HBs抗原 (+ -) HBe抗体 (+ -) HCV抗体 (+ -)

《注射》		Day1	Day5	Day28
シスプラチン	100mg/m ²	↓		
フルオロウラシル持続	5000mg/m ² /5日 【1000mg/m ² /日】	↓	→	

シスプラチン

- ・1日尿量が3000ml以上になるように輸液を行う。
- ・遮光にて投与
- ・腎機能不良の場合は禁忌
- ・Day1～4は尿測と体重測定、Day5～7は体重測定のみを行う。合併症によってその都度対応すること。
- ・適宜利尿薬を併用する。

Day1

				投与ルート	
①	生食500ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン	
②	デキサート1.65mg 4A 生食20ml	IV		側管	
③	Day1 ~ Day5 フルオロウラシル()mg 生食1150ml	DIV	輸液ポンプ 約120時間 10ml/h	側管	

Day2

抗がん薬投与1時間前にアプレピタントカプセル125mg1Cを内服				投与ルート	Day1-③ ↓
①	生食500ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン	
②	ソルデム3A 500ml	DIV	120分	側管	
③	パロノセトロン0.75mg/50ml 1V 生食20ml	IV		側管	
④	デキサート1.65mg 6A 生食20ml	IV		側管	
⑤	シスプラチン()mg 生食300ml (生食200mlを抜く)	DIV	120分	側管	
⑥	20%マンニトール300ml ※湯煎溶解必要	DIV	30分	側管	
⑦	ソルデム3A 500ml	DIV	240分	側管	
⑧	ソルデム3A 500ml	DIV	240分	側管	
⑨~	ソルデム3A 500ml (*尿量をみて必要時追加指示受ける)				

Day3,4

抗がん薬投与1時間半前にアプレピタントカプセル80mg1Cを内服				投与ルート
①	生食500ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
②	デキサート1.65mg 4A 生食20ml	IV		側管

Day5

①	生食500ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
②	デキサート1.65mg 4A 生食20ml	IV		側管

Day2,3,4

デカドロン錠0.5mg 16T 2×朝・昼