

ID	
氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

FP療法	
4週毎	
疾患名	食道癌
T	N M Stage

主治医 \_\_\_\_\_

指導医 \_\_\_\_\_

(身長 \_\_\_\_\_ cm・体重 \_\_\_\_\_ kg) 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

スケジュール HBs抗原 ( + - ) HBc抗体 ( + - ) HCV抗体 ( + - )

《注射》		Day1	Day5	Day28
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	↓		
フルオロウラシル持続	4000mg/m <sup>2</sup> /5日	↓	→	
	【800mg/m <sup>2</sup> /日】			

シスプラチン

- ・1日尿量が3000ml以上になるように輸液を行う。
- ・遮光にて投与
- ・腎機能不良の場合は禁忌
- ・Day1～4は尿測と体重測定、Day5～7は体重測定のみを行う。合併症によってその都度対応すること。
- ・適宜利尿薬を併用する。

Day1

抗がん薬投与1時間前にアプレピタントカプセル125mg1Cを内服			投与ルート	
①	生食500ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
②	生食500ml	DIV	180分	側管
③	フルオロウラシル持続 ( )mg 生食1150ml	DIV	約120時間	側管
④	生食500ml	DIV	180分	側管
⑤	パロノセトロン0.75mg/50ml 1V デキサート1.65mg 6A	DIV	30分	側管
⑦	シスプラチン( )mg 生食300ml	DIV	120分	側管
⑧	20%マンニトール300ml ※湯煎溶解必要	DIV	30分	側管
⑨	生食500ml	DIV	180分	側管
尿量みて必要時補液の追加指示受ける				
Day2 - 5				
①	生食500ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
②	デキサート1.65mg 4A 生食20ml	IV		側管

Day2.3

アプレピタントカプセル80mg 1c 1×朝