

ID	
氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

PTX+BV療法			
3週毎			
疾患名	卵巣癌		
T	N	M	Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m<sup>2</sup>

スケジュール HBs抗原 ( + - ) HBe抗体 ( + - ) HCV抗体 ( + - )

《注射》		Day1	Day8	Day15	Day21
ベバシズマブ	15mg/kg	↓			
パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>				

パクリタキセル

- ・0.22μm以下のインラインフィルターを使用すること。
- ・アルコール過敏症に注意する。
- ・投与開始1時間は過敏反応の有無を頻回を確認する。
- ・心電図モニターを装着する。
- ・壊死性抗がん薬のため血管外漏出に注意すること。

ベバシズマブ

- ・投与前に血圧を測定する。収縮期≥160 or 拡張期≥100を超える場合は主治医に確認する。
- ・出血傾向、血栓有無を確認する。

Day1

				投与ルート
①	レスタミン10mg 5錠	内服	抗がん剤投与30分前	
②	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
③	デキサート1.65mg 4A 生食20ml	IV		側管
④	ファモチジン注射液20mg 1A	IV		側管
⑤	ベバシズマブ ( )mg 生食100ml	DIV	初回90分 2回目60分 以後30分	側管
⑥	パクリタキセル( )mg 5%ブドウ糖液500ml	DIV	180分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				