

ID 氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

**Weekly PTX 療法**  
**4週毎**  
疾患名 尿路上皮癌（膀胱癌）

T      N      M      Stage

---

**主治医**

---

**指導医**

---

(身長                  cm・体重                  kg) 体表面積                  m<sup>2</sup>

---

スケジュール    HBs抗原 ( + - )    HBc抗体 ( + - )    HCV抗体 ( + - )

《注射》		Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	↓	↓	↓		

**パクリタキセル**

- ・0.22 μm以下のインラインフィルターを使用すること。
- ・アルコール過敏症に注意する。
- ・投与開始1時間は過敏反応の有無を頻回に確認する。
- ・心電図モニターを装着する。
- ・壊死性抗がん薬のため血管外漏出に注意すること。

**Day1.8.15**

				投与ルート
①	レスタミン10mg 5錠	内服	抗がん剤投与30分前	
②	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
③	デキサート1.65mg 4A 生食20ml	DIV		側管
④	ファモチジン静注20mg 1A	DIV		側管
30分後				
⑤	パクリタキセル(                  )mg 5%ブドウ糖液250ml	DIV	60分	側管