

ID 氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

Weekly PTX 単独療法	
4週毎	
疾患名	食道癌
T	N M Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m<sup>2</sup>  
 スケジュール 原 ( + - ) HBc抗体 ( + - ) HCV抗体 ( + - )

《注射》 パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	Day1 ↓	Day8 ↓	Day15 ↓	Day22	Day28
-----------------	----------------------	-----------	-----------	------------	-------	-------

パクリタキセル

- ・0.22 μm以下のインラインフィルターを使用すること。
- ・アルコール過敏症に注意する。
- ・投与開始1時間は過敏反応の有無を頻回に確認する。
- ・心電図モニターを装着する。
- ・壊死性抗がん薬のため血管外漏出に注意すること。

### Day1.8.15

				投与ルート
①	レスタミン10mg 5錠	内服	抗がん剤投与30分前	
②	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
③	デキサート1.65mg 4A 生食20ml	DIV		側管
④	ファモチジン静注20mg 1A	DIV		側管
30分後				
⑤	パクリタキセル( )mg 5%ブドウ糖液250ml	DIV	60分	側管