ID
氏名

生年月日

年齢　　性別
科名　　病棟

mFOLFOX6療法
ポート
2週毎

疾患名　　大腸癌

T　N　M　Stage

主治医　　指導医

(身長　　cm・体重　　kg) 体表面積　　㎡

スケジュール　　HBs抗原（ ＋ － ）　HBc抗体（ ＋ － ）　HCV抗体（ ＋ － ）

《注射》

		Day1	Day2	Day14
オキサリプラチン	85mg/㎡	↓		
レボホリナート	200mg/㎡	↓		
フルオロウラシルワンショット	400mg/㎡	↓		
フルオロウラシル持続	2400mg/㎡/46hr	↓ ・・・	→	

オキサリプラチン

・末梢神経障害緩和のためホットパックを使用する。
・治療期間中は冷感刺激を避ける。(金属類との接触、冷たい食事や飲み物、エアコンの風など)

Day1

				投与ルート	
①	アプレピタントカプセル125mg 1C	内服	オキサリプラチン投与1時間前		
②	生食100ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン	
③	パロノセトロン0.75㎎/50ml　1V デキサート1.65mg　4A	DIV	30分	側管	
④	オキサリプラチン(　　)mg 5%ブドウ糖液250ml	DIV	120分	側管	同時滴下
⑤	レボホリナート(　　)mg 5%ブドウ糖液250ml	DIV		側管	
⑥	フルオロウラシル(　　)mg 生食50ml	DIV	15分	側管	
⑦	フルオロウラシル(　　)mg 生食(フルオロウラシルと合わせて全量100ml)	DIV	シュアーフューザーポンプ46時間	側管	

Day2.3 ★処方確認　17時までに病棟に薬があがっているか確認　申し送りへ記載

①	アプレピタントカプセル80mg　　1c　1×朝	内服	
②	デカドロン錠0.5mg　　8T　2×朝･昼	内服	