

| | |
|------|----|
| ID | |
| 氏名 | |
| 生年月日 | |
| 年齢 | 性別 |
| 科名 | 病棟 |

S-1+Weekly CDDP療法
3週毎
疾患名 **胃癌**
T N M Stage

主治医 _____ 指導医 _____
(身長 _____ cm・体重 _____ kg) 体表面積 _____ m²

スケジュール HBs抗原 (+ -) HBc抗体 (+ -) HCV抗体 (+ -)

| | | | |
|-----------------------------|---------|----------|---------|
| 《注射》 | Day1 | Day8 | Day21 |
| シスプラチン 20mg/m ² | ↓ | ↓ | |
| 《内服》 | Day1(夕) | Day15(朝) | 《7日間休薬》 |
| エスワンタイホウ (テガフル・ギメラシル・オテラシル) | ↓ | ↓ | ↔ |

シスプラチン

- ・1日尿量が3000ml以上になるように輸液を行う。
- ・遮光にて投与。
- ・腎機能不良の場合は禁忌。
- ・Day1~4は尿測と体重測定、Day5~7は体重測定のみを行う。合併症によってその都度対応すること。
- ・適宜利尿薬を併用する。

(レジメン)Day1.8

| 抗がん薬投与1時間前にアプレピタントカプセル(125mg)1Cを内服 | | | | 投与ルート |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------|-------|
| ① | 生食500ml | DIV | 血管確保(20ml/h) | メイン |
| ② | ソルラクト500ml 硫酸mg補正液(1mEq/ml) 20ml | DIV | 90分 | 側管 |
| ③ | ①の血管確保用生食の残を投与 (終了する30分前に④⑤を投与) | DIV | 250ml/H | 側管 |
| ④ | アロキシ(0.75mg/5ml) 1V 生食15ml | IV | | 側管 |
| ⑤ | デキサート(1.65mg) 6A 生食20ml | IV | | 側管 |
| ⑥ | 生食500ml | DIV | 血管確保(20ml/h) | メイン |
| ⑦ | シスプラチン()mg 生食250ml | DIV | 60分 | 側管 |
| 終了後メインの生食でルート内フラッシュ | | | | |
| ⑧ | ⑥の生食の残を投与 | DIV | 90分 | 側管 |

Day2.3、9.10

アプレピタントカプセル(80mg) 1c 1×朝
デカドロン錠(0.5mg) 16T 2×朝・昼

Day1(夕)~15(朝)

エスワンタイホウ () mg/day 2×朝・夕

| 体表面積 | 1日用量(テガフル相当量) |
|---------------------------------------|---------------|
| 1.25m ² 未満 | 80mg/day |
| 1.25m ² ~1.5m ² | 100mg/day |
| 1.5m ² 以上 | 120mg/day |