

| | |
|------|----|
| ID | |
| 氏名 | |
| 生年月日 | |
| 年齢 | 性別 |
| 科名 | 病棟 |

| | | | |
|-------|----|---|-------|
| SOX療法 | | | |
| 3週毎 | | | |
| 疾患名 | 胃癌 | | |
| T | N | M | Stage |

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m²
 スケジュール HBs抗原 (+ -) HBe抗体 (+ -) HCV抗体 (+ -)

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| 《注射》 オキサリプラチン | 100mg/m ² | Day1 ↓ | Day21 |
| 《内服》 エスワンタイホウ (テガフル・ギメラシル・オテラシル) | ↓ | Day1(夕) | Day15(朝) 《7日間休薬》 ↔ |

オキサリプラチン

- ・末梢神経障害緩和のためホットパックを使用する。
- ・治療期間中は冷感刺激を避ける。(金属類との接触、冷たい食事や飲み物、エアコンの風など)

(レジメン)Day1

| 抗がん薬投与1時間前にアプレピタントカプセル(125mg)1Cを内服 | | | | 投与ルート |
|------------------------------------|---|-----|--------------|-------|
| ① | 生食250ml | DIV | 血管確保(20ml/h) | メイン |
| ② | アロキシ(0.75mg/5ml) 1V 生食15ml | IV | | 側管 |
| ③ | デキサート(1.65mg) 4A 生食20ml | IV | | 側管 |
| ④ | オキサリプラチン()mg デキサート(1.65mg) 4A 5%ブドウ糖液250ml | DIV | 120分 | 側管 |
| 終了後メインの生食でルート内フラッシュ | | | | |

Day2,3

アプレピタントカプセル(80mg) 1c 1×朝
 デカドロン錠(0.5mg) 8T 2×朝・昼

Day1(夕)~15(朝)

エスワンタイホウ () mg/day 2×朝・夕

| 体表面積 | 1日用量(テガフル相当量) |
|---------------------------------------|---------------|
| 1.25m ² 未満 | 80mg/day |
| 1.25m ² ~1.5m ² | 100mg/day |
| 1.5m ² 以上 | 120mg/day |