

| |
|------|
| ID |
| 氏名 |
| 生年月日 |
| 年齢 |
| 科名 |
| 性別 |
| 病棟 |

Weekly CDDP+Capecitabine療法
3週毎
疾患名 胃癌

T N M Stage

主治医 _____ 指導医 _____
(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m²

スケジュール HBs抗原 (+ -) HBc抗体 (+ -) HCV抗体 (+ -)

| | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 《注射》 シスプラチン 20mg/m ² | Day1 ↓ | Day8 ↓ | Day21 |
| 《内服》 カペシタビン | Day1(夕) ↓ | Day15(朝) ↓ | 《7日間休薬》 ←→ |

シスプラチン

- ・1日尿量が3000ml以上になるように輸液を行う。
- ・遮光にて投与。
- ・腎機能不良の場合は禁忌。
- ・Day1～4は尿測と体重測定、Day5～7は体重測定のみを行う。合併症によってその都度対応すること。
- ・適宜利尿薬を併用する。

(レジメン)Day1,8

| 抗がん薬投与1時間前にアプレピタントカプセル(125mg)1Cを内服 | | | | 投与ルート |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------|-------|
| ① | 生食500ml | DIV | 血管確保(20ml/h) | メイン |
| ② | ソルラクト500ml 硫酸mg補正液(1mEq/ml) 20ml | DIV | 90分 | 側管 |
| ③ | ①の血管確保用生食の残を投与 (終了する30分前に④⑤を投与) | DIV | 250ml/H | 側管 |
| ④ | アロキシ(0.75mg/5ml) 1V 生食15ml | IV | | 側管 |
| ⑤ | デキサート(1.65mg) 6A 生食20ml | IV | | 側管 |
| ⑥ | 生食500ml | DIV | 血管確保(20ml/h) | 側管 |
| ⑦ | シスプラチン()mg 生食250ml | DIV | 60分 | 側管 |
| 終了後メインの生食でルート内フラッシュ | | | | |
| ⑧ | ⑥の生食の残を投与 | DIV | 90分 | 側管 |

Day2,3, 9,10
アプレピタントカプセル(80mg) 1c 1×朝
デカドロン錠(0.5mg) 16T 2×朝・昼

Day1(夕)～15(朝)
カペシタビン() mg/day 2×朝・夕

| 体表面積 | 1日用量 |
|--|------------|
| 1.36m ² 未満 | 2400mg/day |
| 1.36m ² ～1.66m ² | 3000mg/day |
| 1.66m ² ～1.96m ² | 3600mg/day |
| 1.96m ² 以上 | 4200mg/day |